


# شلل الأطفال (بوليو)

بيان الحقائق



ينتشر شلل الأطفال من شخص إلى آخر عندما يكون هناك اتصال مع إفرازات حلق الشخص المصاب. يمكن أن ينتشر شلل الأطفال أيضا عن طريق ملامسة براز الشخص المصاب.

شلل الأطفال ، المعروف أيضا باسم بوليو ، هو مرض ناجم عن فيروس يعيش في الحلق والأمعاء. يصيب الفيروس الغدد الليمفاوية والجهاز العصبي ويمكن أن يسبب تلف الأعصاب والشلل. وكانت آخر إصابة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة في عام 1979.

## العلامات والأعراض



الصداع



غثيان



التعب



الحمى

معظم الأشخاص المصابين بشلل الأطفال لن يكون لديهم علامات أو أعراض. عندما تكون العلامات والأعراض موجودة ، يمكن أن تشمل الحمى والتعب والصداع وتصلب الرقبة والظهر والألم في الأطراف. الشلل يمكن أن يؤدي إلى العجز الدائم والموت.

## الوقاية

التلقيح هو أفضل وسيلة للوقاية من شلل الأطفال وهو الطريقة الوحيدة لوقف انتشار المرض.



## لمزيد من المعلومات

اتصل بطبيبك أو مركز ماين لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الرقم 1-800-821-5821 للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك أيضا زيارة [www.cdc.gov/polio](http://www.cdc.gov/polio).

